

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα και όλων των εξαρτημάτων με νερό και απολυμαντικό. Ξεπλύνετε καλά τρεις φορές με καθαρό νερό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν εφαρμόζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκεύασματος

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και τρόπο εφαρμογής.

Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποιησμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και ασπόνδυ. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείτε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άριστο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν ο ερεθισμός παραμένει συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάσπονσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέστε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μη δίνετε πίπτωτα από το στόμα σε αναθίστητο άτομο. Σε περίπτωση εισονήσης: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 210-7793777

PMV®-01

Εγγυημένη σύνθεση: Pepino mosaic virus, strain CH2, isolate 1906 που ισοδυναμεί με 5×10^5 αντίγραφα γονιδιώματος του ιού /μλ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΑ

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 11.110 / 24-05-2017

Κάτοχος της έγκρισης: De Ceuster Meststoffen N.V.

Fortsesteenweg 30, 2860 Sint-Katelijne-Waver, T.K.: 2860, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: GEMMA Import and Commercial Co, Λ. Θρακομακεδόνων 107, 13679, Αχαρνές – Αθήνα, Τηλ.: 210 2434006, Fax: 210 2434008

Προφυλάξεις: P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. P260: Μην ανταντέψετε εκνεύφωμα. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή κατηνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P284: Φοράτε μέσα απομικής προστασίας της αναπνοής. Περιέχει Pepino mosaic virus, strain CH2, isolate 1906.

Μπορεί να προκαλέσει ειασμοθρόπιση, SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. EUN 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Πικνό εναέριόμα (SC)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ/ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

PMV®-01

PEPINO MOSAIC VIRUS, STRAIN CH2, ISOLATE 1906

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
1 ΛΙΤΡΟ

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε: Μέτρα υγιεινής: Πριν την εφαρμογή του σκεύασματος και μετά από τον προηγούμενο κύκλο παραγωγής, συνιστάται λεπτομερές καθαρισμός και απολύμανση του θερμοκρητίου. Μετά την εφαρμογή του σκεύασματος, ο χρήστης πρέπει να λάβει αυστηρά μέτρα υγιεινής καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόδοση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση λίγηντα τριπλό έξτηπλουμ (τα νερά του ξεπλυμάτος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και αφού καταστραφόμενο τριπλά, για τη διασφάλιση της μη περιεργού χρήσης, τελικά εναποθίβενται σε σημείο υγρανογής, η ανάκτηση ενεργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκεύασματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική και καλά κλειδωμένη συσκευασία, σε θερμοκρασία ψυγείου (4°C). Σ' αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 21 ημέρες από την ημερομηνία παρασκευής του.

Χρονικό διάστημα ασφαλίσεως μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει τα τελείων του ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Ειδικό προϊόν για τον εμβολιασμό στοπόρφυτων τομάτας θερμοκρητίου προς αποφυγή ζημιάς που προκαλείται από τον pepino mosaic virus (ιό της μωσαϊκώσης). Εφαρμόζεται προηπικά και προστατεύει την καλλιέργεια από όλα τα στελέχη του ιού.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Τομάτα (θερμοκρητίου): Εμβολιασμός των στοπόρφυτων προς αποφυγή ζημιάς που προκαλείται από τον pepino mosaic virus (ιό της μωσαϊκώσης) δόση 400 κ.εκ./στρέμμα (που ισοδυναμούν σε 2×10^{11} viral genome copies) ή 800 κ.εκ./στρέμμα (που ισοδυναμούν σε 4×10^{11} viral genome copies) όπων απαιτείται ταχύς αποκισμός των στοπόρφυτων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 16-30 λίτρο/στρ. Ψεκασμός χαμηλού όγκου στα στοπόρφυτα, αμέσως μετά τη φύτευση, έως πριν την άνθηση της καλλιέργειας.

Παρατηρήσεις: Τα φυτά δεν πρέπει να νοσούν από τον ιό της μωσαϊκώσης κατά την εφαρμογή του σκεύασματος. Για αυτό, μέσα στη πλαίσιο της στρατηγικής του εμβολιασμού, συνιστάται η ανάλυση φυτικού υλικού σε αρμόδιο εργαστήριο, πριν τη φύτευση ή το αργότερο τρεις μέρες μετά. Σε περίπτωση αποδειγμένης, διασκορπισμένης μόλυνσης, η εφαρμογή του σκεύασματος δεν ενδείκνυται.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιόδο: 1 εφαρμογή.

Τρόπος εφαρμογής: Η εφαρμογή του σκεύασματος πρέπει να γίνεται μόνον από κατάλληλα εκπταδιεμένους χειριστές. Ομιλητηρός ψεκασμός, χαμηλού όγκου, στα στοπόρφυτα, αμέσως μετά τη φύτευση, με πίεση 5 - 6 bar και απόσταση > 30 εκ. από το φύλλωμα. Πρέπει να εφαρμοστεί η πλήρης δόση αποθεύσεις στα φυτά. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού καθίσταται τα φύλτρα και κάνεται ομογενοποίηση του διάλλαγματος ψεκασμού τακτικά (κάθε 2 ώρες). Οταν χρησιμοποιείται ιστός ψεκασμού (spray boom) για την εφαρμογή σε φυτά με διάταξη σε φράχτη, χρησιμοποιείται μόνο ένα ακροφύσιο.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαραίμενη ποσότητα σκεύασματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδένοντας καλά μετά την αράβωση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Εφαρμόστε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού. Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να είναι $> 15^{\circ}\text{C}$.



0 000000 000000